



Geschäftsführung: C. Dienhold, S. Höpfner  
Ärztliche Leitung: Dr. U. Menzel

### Insulindosierungstabelle

Name:.....Arzt:.....Datum:.....

	morgens	vormittags	mittags	nachmittags	abends	spät
Normalinsulin i.E./KE						
Analoginsulin iE/KE						
Basalinsulin iE						

	morgens	mittags	abends	spät
1 i.E. Insulin senkt den BZ um				
Korrektur ab BZ mg/dl mit Bolusinsulin + 1,0 i.E.				
+ 2,0 i.E.				
+ 3,0 i.E.				
+ 4,0 i.E.				
+ 5,0 i.E.				
+ 6,0 i.E.				
maximale Korrekturdosis	+ i.E.	+ i.E.	+ i.E.	+ i.E.

Merke: BZ über 250 mg /dl Keton (Aceton) im Urin/ Blut messen!!!

### Spritz- Ess- Abstand (SEA)

	Normalinsulin	Kurzwirksames Analoginsulin
BZ unter 70 mg/dl	Nach dem Essen spritzen	Nach dem Essen spritzen
BZ 70 - 80 mg/dl	Spritzen und sofort Essen	
BZ 80 - 140 mg/dl	10 min. warten	Spritzen und sofort Essen
BZ 140 - 200 mg/dl	15 min. warten	10 Min. warten
BZ 200 – 250 mg/dl	20 min. warten	15 Min. warten
BZ über 250 mg/dl	30 min. warten	20 min. warten

Autor: Ahwerst